

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN N° 105 de JUIN 1969

24 Juin 1969 / N° 23

V I G N E

AVERTISSEMENT

Mildiou :

Nous renouvelons tous les termes de notre avis du 17 juin en insistant plus particulièrement sur la nécessité, en raison des précipitations actuelles, d'utiliser les doses maxima des spécialités commerciales et de renouveler fréquemment les traitements, si toutefois l'accès des terrains est possible.

INFORMATION

Oïdium :

Les pluies fréquentes privant les poudrages d'une grande partie de leur efficacité, l'utilisation des soufres mouillables est plus spécialement conseillé.

A R B R E S F R U I T I E R S

AVERTISSEMENTS

Tavelures du pommier et du poirier :

Surveiller attentivement le verger et renouveler la protection après une chute de pluie de plus de 15 mm surtout dans les vergers où la tavelure est présente.

Carpocapse des pommes :

De nouvelles éclosions doivent avoir lieu à partir du 27 juin. Dès cette date, il importe d'assurer une bonne protection de la récolte dans l'ensemble des vergers.

Renouveler le traitement en fonction des pluies qui peuvent survenir.

/ ...

GRANDE CULTURE

AVERTISSEMENT

Mildiou de la pomme de terre

Les traitements recommandés ont permis de maintenir les cultures en état sanitaire satisfaisant. Il est conseillé de renouveler la protection des variétés sensibles au mildiou avant le 27 juin. Ce traitement ne s'impose pas dans les pièces ne présentant pas actuellement de taches et à arracher avant le 5 juillet.

Il est rappelé que toute pluie, ou ensemble de précipitations supérieures à 20 mm, amènent un lessivage du produit fongicide nécessitant une nouvelle application dans les meilleurs délais.

INFORMATIONS

Tordeuse du pois

Réaliser un traitement contre ce parasite dans les prochains jours et avant le 28 juin.

Il est rappelé que sur les cultures en pleine floraison susceptibles d'être visitées par les abeilles, il ne doit être mis en oeuvre que des insecticides reconnus non dangereux pour les insectes mellifères.

Utiliser :

- Phosalone - 600 g. matière active à 1'ha
- Diethion - 1.000 g. " " " "

Si la période de pleine floraison est passée, d'autres insecticides peuvent être utilisés. Dans la région, le Carbaryl, à 800 g. de matière active à l'hectare, a donné des résultats très satisfaisants.

Cercosporiose de la betterave

Il n'y a pas à envisager d'intervention prochaine contre cette maladie.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,
R. PARIS - H. de MEIRLEIRE
et A. GODIN

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopathologique CHAMPAGNE,
J. DELATTRE